Medicamente care se opresc înainte de operație

Unele medicamente cresc riscul de sângerare sau de complicații la anestezie. Lista conține exemple de denumiri comerciale frecvente în România și nu este completă – verificați și substanța activă de pe cutie. **Nu opriți niciun medicament fără acordul medicului.**

Categorie	Substanță activă	Denumiri comerciale (exemple)	Când se opresc, de obicei
Antiagregante plachetare	Acid acetilsalicilic	Aspenter, Aspirin Cardio, Thrombo ASS, Aspirin	Cu 7 zile înainte
	Clopidogrel	Plavix, Zyllt, Trombex; DuoPlavin	Cu 5–7 zile înainte
	Ticagrelor	Brilique	Cu 5 zile înainte
	Prasugrel	Efient	Cu 7 zile înainte
Anticoagulante orale	Acenocumarol	Sintrom, Trombostop	Cu 5 zile înainte, control INR
	Warfarină	Warfarin	Cu 5 zile înainte, control INR
	Rivaroxaban	Xarelto	Cu 2–3 zile înainte*
	Apixaban	Eliquis	Cu 2–3 zile înainte*
	Dabigatran	Pradaxa	Cu 2–4 zile înainte*
	Edoxaban	Lixiana	Cu 2–3 zile înainte*
Anticoagulante injectabile	Enoxaparină, nadroparină	Clexane, Fraxiparine	Ultima doză cu cel puțin 24 de ore înainte
Antiinflamatoare (AINS)	Ibuprofen, diclofenac, ketoprofen, naproxen, meloxicam, nimesulid	Nurofen, Ibalgin, Paduden, Voltaren, Diclac, Ketonal, Aleve, Movalis, Aulin, Nimesil	Cu 3–7 zile înainte
Antidiabetice	Empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin	Jardiance, Forxiga, Invokana (și combinațiile lor)	Cu 3 zile înainte
	Metformin	Siofor, Glucophage	În ziua operației (uneori cu 24–48 h înainte)
	Agoniști GLP-1 (săptămânali)	Ozempic, Wegovy, Trulicity, Mounjaro	Discutați cu anestezistul – de obicei cu o săptămână înainte
Tratamente hormonale	Estrogeni, progestative	Diverse	Discutați cu medicul
Suplimente și plante	Ginkgo biloba, omega-3 în doze mari, usturoi, ginseng, vitamina E, sunătoare	Tanakan, Bilobil și altele	Cu 1–2 săptămâni înainte

* Mai mult dacă rinichii funcționează mai slab.

Nu opriți singur(ă)!

Momentul opririi îl stabilesc neurochirurgul și cardiologul – mai ales dacă aveți stent, valvă mecanică, fibrilație atrială sau ați avut un AVC ori o tromboză. Uneori este nevoie de o „terapie de punte” cu injecții.

Ce continuați

Antiepilepticele – obligatoriu, în aceeași doză și același număr de prize, inclusiv în ziua operației (doza de dimineață mai devreme, la ora indicată de medic). De obicei și tratamentul pentru tensiune, tiroidă, colesterol sau stomac. Pentru durere: **paracetamol**.

Valori orientative. Urmați întotdeauna indicațiile medicului dumneavoastră. meningiom.ro · Informații actualizate în 2026.